



Grandes cultures

BULLETIN N° 433 DU 4 AVRIL 1988 - ENVOI N° 21

POMME DE TERRE : Maintenez la protection anti-mildiou

BETTERAVE : Oïdium seulement

MAIS : Régression des pucerons

TOURNESOL : Situation saine

POMME DE TERRE

► MILDIOU :

* Situation : Les foyers, dans l'ensemble n'évoluent pas. Mais les conditions climatiques sont toujours favorables.

* Préconisation : Il faut maintenir la protection du feuillage.

➔ dans les parcelles saine de mildiou : réalisez dès que possible un traitement avec un produit de contact ou un pénétrant compte tenu du lessivage récent des produits dûs aux pluies.

➔ si vous observez des foyers : arrachez-les et détruisez-les. Réalisez au plus vite un traitement associant une matière active pénétrante et de contact

➔ En cas de fortes attaques : défendez la culture

742



BETTERAVE

► MALADIES DU FEUILLAGE :

- * Situation : L'OIDIUM a été observé dans le Nord de la Seine et Marne.
C'est la seule maladie actuellement en évolution.

- * Préconisation :

→ En cas de symptômes d'oidium, traitez au plus vite avec un produit à base de soufre.

→ Restez vigilants pour les autres maladies.

En cas d'évolution rapide de la situation, nous vous tiendrons informés sur MINITEL 36-17 code AVERT.

MAIS

► PUCERONS :

- * Situation : Régression des colonies suite aux derniers orages.
Actuellement, on observe très peu de colonies et des aptères isolés parasités, ce qui montre un regain d'activité des auxiliaires.

Néanmoins, l'observation d'ailés nous incite à vous conseiller de rester vigilants jusqu'à la fin de la phase de sensibilité du maïs, c'est à dire 3 semaines après le début de la fécondation.

TOURNESOL

► MALADIES :

- * Situation : pas d'évolution notable, les capitules sont sains.

► ► REGLEMENTAION : UTILISATION DES PRODUITS ANTI-PARASITAIRES :

L'arrêté du 5 Juillet 1985, relatif à l'application des produits anti-parasitaires à usage agricole, a limité l'emploi de ceux-ci aux seuls usages autorisés.

La mise en application de ce texte, initialement prévue en Juillet 1988, est reportée au 31 DECEMBRE 1988.

→ RECTIFICATIF : Une erreur s'est glissée dans le tableau "Désherbage du blé avant moisson" publié dans le bulletin 428 du 18 Juillet 1988 : Désherbage du chiendent rampant : employer 3 l/ha RONDUP + 1 l/ha de FRIGATE.